

## 1.2.2. Diffuseur professionnel Nassenheider

### Mesures de protection :

L'acide formique (Formivar) est très corrosif. Sa manipulation exige une grande prudence. Il faut dans tous les cas porter des lunettes de protection, des gants résistants aux acides et des vêtements à manches longues.

### Matériel nécessaire :

- Diffuseur professionnel Nassenheider
- Formivar à 60 % (Andermatt BioVet AG)
- Gants résistant aux acides et lunettes de protection (masque de protection)
- Seau d'eau (pour laver rapidement les éventuelles éclaboussures d'acide)

### Points à retenir :


- Premier traitement avant fin juillet (après récolte de miel), deuxième traitement (2 semaines) : commencer au plus tard à mi-septembre.
- Hausse vide : 1 hausse favorise une bonne évaporation et encore davantage, dans une ruche suisse, avec un coussin en mousse synthétique posé dessus.
- Placer le diffuseur dans la colonie de préférence tôt le matin, quand il fait encore frais.
- Lors du traitement, les colonies doivent disposer de cellules de nourriture non operculée.
- Veiller à déranger le moins possible les colonies lors de la mise en place du diffuseur.
- Au cours du traitement, ne pas nourrir les colonies.

## Procédure :


Respecter impérativement le mode d'emploi du diffuseur.

1. Porter l'équipement de protection.
2. Remplir chez soi la bouteille avec la bonne quantité d'acide (voir [mode d'emploi](#)).
3. Montage et mise en place du diffuseur (voir [mode d'emploi](#)).
4. En cas de fond ouvert, remettre le tiroir varroa. A faire idéalement une semaine avant le traitement ; permet d'améliorer son efficacité.
5. Laisser le trou de vol ouvert (l'ouvrir totalement pour les ruches suisses).
6. Adapter la surface du papier selon le [mode d'emploi](#). Une ruche suisse équipée de 12 cadres à couvain correspond à peu près au volume d'un rayon à hausse unique Deutsch Normalmass (DNM) ou Zander.  
Placer l'assiette de base avec le diffuseur sur les cadres de couvain.
7. Mettre en place le nourrisseur couvre-cadres/la demi-hausse vide ou la hausse vide pour la ruche suisse.
8. Contrôler la quantité d'évaporation après 24 heures ; au besoin, adapter la surface du papier.

### Ruche à hausses multiples



### Ruche suisse



Lien vers le mode d'emploi du diffuseur Nassenheider :

[www.nassenheider.com/public/de/index.php?controller=attachment&id\\_attachment=9](http://www.nassenheider.com/public/de/index.php?controller=attachment&id_attachment=9)